

آفات و بیماری‌های گیاهی

جلد ۷۰، شماره ۱، شهریور ۱۳۸۱

بررسی علل ترجیح غذایی سوسک سرخرطومی خنابی خرما،

Rhynchophorus ferrugineus Oliv.

Investigation on the reasons of food preference of red palm weevil, *Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.

حسین فرازمند

آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی سراوان

(تاریخ دریافت: خرداد ۱۳۸۰، تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۸۱)

چکیده

سرخرطومی خنابی خرما، *Rhynchophorus ferrugineus* Oliv. از آفات خطرناک نخلات گوناگون در آسیا، شمال آفریقا و جنوب اروپا می‌باشد. در حال حاضر این حشره جزو آفات قرنطینه داخلی ایران است که خسارت آن به شهرستان سراوان (استان سیستان و بلوچستان) محدود می‌شود. همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده، رقم مضافی به عنوان مطلوب ترین میزان برای این آفت شناسایی شده است.

در طول سال‌های ۱۳۷۸-۷۹، آزمایش‌های متعددی در زمینه ترجیح غذایی سرخرطومی خنابی خرما روی ۵ رقم خرما شامل مضافی، ربی، هلیله، زردان، پیمازو و گیاه نخل وحشی با نام علمی *Nannorrhops ritchiana* (Griff) Aitch. انجام شد.

براساس نتایج بدست آمده، بیشترین درصد مرگ و میر لاروی در رقم زردان و گیاه نخل وحشی و کمترین آن در مضافی و هلیله بوده و حداقل تلفات شفیرگی در نخل وحشی به ثبت رسید. حداقل درصد ظهور حشرات کامل به ترتیب در مضافی و نخل وحشی مشاهده شد. همچنین طولانی‌ترین دوره رشد و نمو سرخرطومی خنابی در رقم زردان

و کوتاهترین آن در ارقام هلیله و مضافتی بود. بیشترین میزان تخم‌ریزی روزانه در مضافتی و کمترین آن در زردان مشاهده گردید.

جهت بررسی علل ترجیح غذایی، بافت آوندی ارقام مختلف تجزیه و مقادیر وزن خشک، فیبر خام، قند و چربی کل و ۱۲ عنصر غذایی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون گام به گام نشان داد که اثرات متقابل بین ترکیبات غذایی مختلف روی عوامل رشدونموی سرخرطومی خنایی خرما تاثیر می‌گذارد و در بین ترکیبات غذایی فوق، نقش قندکل و کلسیم ملموس تر می‌باشد. قندها در رشد و نمو آفت تاثیر مثبت داشته، بطوریکه با افزایش قند میزان تلفات آفت کاهش و در صد ظهور حشرات کامل و نیز میزان تخم‌ریزی روزانه افزایش می‌یابد. در حالی که افزایش کلسیم موجب کاهش رشد حشره و افزایش تلفات آن و در نتیجه منجر به مهارکردن رشدونمو آفت می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سوسک سرخرطومی، ترجیح غذایی، خرما

مقدمه

سوسک سرخرطومی خنایی خرما (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.) (Col.: Curculionidae)، از مهمترین آفات نخلات گوناگون در جهان بوده که در دو دهه اخیر در اکثر کشورهای خرمائیز خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب اروپا گسترش یافته است. در برخی کشورهای عربی ۵-۶ درصد درختان خرمابه این آفت آلوده هستند که از نظر اقتصادی خسارت مهمی محسوب می‌گردد. این حشره در جنوب و جنوب شرقی آسیا از مهمترین آفات نارگیل بوده که علاوه بر آن به سایر نخلات مسانند نخل روغنی، نخل زیستی و غیره آسیب می‌رساند.

این آفت برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ در نخلستان‌های شهرستان سراوان (استان سیستان و بلوچستان) مشاهده گردید. خسارت اصلی سرخرطومی خنایی خرما توسط مرحله لاروی صورت می‌گیرد. لاروها تمام طول دوره زندگی خود را در داخل نخل سپری کرده و ضمن تغذیه از دسته‌های آوندی، جوانه مرکزی و غلافهای تازه و لیفی نشده برگ، کانال‌هایی در جهات مختلف ایجاد می‌کنند (آوند فقیه، ۱۳۷۴).

طبق بررسی های بعمل آمده در کشورهای حوزه خلیج فارس، در اثر حمله آفت مزبور میزان تولید خرما از ۱۰ تن به حدود ۰/۷ تن در هکتار کاهش پیدا می کند (Hanounik, 1998). در ایران نیز میزان خسارت سرخرطومی جنایی خرما با سایر آفات خرما قابل مقایسه نمی باشد و این آفت در مدت کوتاهی سبب مرگ نخل می شود، از اینرو تهدیدی جدی برای سلامت نخلستان های کشور محسوب می گردد. در حال حاضر سرخرطومی جنایی خرما یکی از آفات قرنطینه داخلی کشور می باشد که سالانه موجب آسودگی بیش از ۱۰۰۰ اصله درخت خرما در شهرستان سراوان می گردد که این مقدار تقریباً معادل ۱٪ مجموع درختان خرمای منطقه است.

در ارتباط با بررسی حساسیت ارقام مختلف خرما به سرخرطومی جنایی ، Baloch و همکاران در سال ۱۹۹۴ در پاکستان ، آزمایشی پیرامون فراوانی و خسارت این آفت بر روی ارقام هشت ساله خرما انجام داده و با تعیین میزان خسارت و عملکرد در ارقام مختلف، رقم های حساس و مقاوم را تعیین نمودند. این آفت در منطقه سراوان ارقام مختلف خرما از قبیل مضافتی، ربی، هلیله و ... را مورد حمله قرار می دهد که بیشترین میزان آسودگی مربوط به ارقام مضافتی و هلیله می باشد. همچنین خداکثر و حداقل طول دوره زندگی آفت در شرایط صحراوی به ترتیب در رقم های زردان و مضافتی به ثبت رسیده و در گیاه نخل وحشی، هیچ حشره کاملی ظاهر نگردیده است. با توجه به بررسی های بعمل آمده، رقم مضافتی به عنوان مناسب ترین میزان برای سرخرطومی جنایی خرما شناسایی شده است (فرازمند و همکاران، ۱۳۷۹). این تحقیق درباره ترجیح غذایی سرخرطومی جنایی روی رقم های مختلف خرما و نخل وحشی و بررسی علل آن صورت گرفته است.

روش بررسی

آزمایش بررسی ترجیح غذایی سرخرطومی جنایی خرما روی ۵ رقم خرما شامل مضافتی، ربی، هلیله، زردان، پیمازو و گیاه نخل وحشی (داز)، طی سال های ۱۳۷۸-۷۹ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳۰ تکرار صورت گرفت. این آزمایش بصورت جداگانه روی

جیره غذایی بافت آوندی تنه درختان ارقام مختلف در اتاق پرورش بنا شرایط ثابت (دمای 29 ± 2 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 80 درصد و فتوپریود ۱۲:۱۲ L:D) انجام شد. برای این منظور، پاچوش ارقام مختلف برش داده شده و بافت آوندی آنها به قطعات مکعبی شکل تقسیم گردید. قطعات بافت آوندی و لاروهای نوزاد (حاصل از یک حشره ماده) توزین و سوراخ کوچکی در سطح مقطع بافت آیجاد شد. در درون هر سوراخ یک لارو قرار داده شد و سپس هر قطعه بافت آوندی در یک ظرف پلاستیکی استوانه‌ای به قطر ۱۴ و ارتفاع ۹ سانتی متر قرار گرفتند و به فواصل ۵ روز، لاروها را از درون بافت خارج نموده و بافت باقیمانده و لاروها توزین شدند. در مرحله بعدی لاروها به درون قطعات بافت آوندی تازه مستقل گردیدند. این عمل تا مرحله شفیرگی ادامه یافت. پس از تشکیل پیله، شفیره‌ها از درون بافت جدا شده و بطور جداگانه در ظروف پلاستیکی به قطر ۴ و ارتفاع ۶ سانتی متر تا زمان خروج حشرات کامل نگهداری گردیدند. سپس یک جفت حشره نر و ماده غیر بارور بدست آمده از هر رقم در چند تکرار بطور جداگانه به منظور تغذیه و تخم‌ریزی درون ظروف پلاستیکی به ابعاد $10 \times 15 \times 15$ سانتی متر با همان جیره غذایی قبلی لارو نگهداری شدند. به فواصل ۲ روز، قطعات بافت آوندی شکافته شده و تخم‌های درون بافت بدقت جدا گشته و در درون ظروف پنجه محتوى کاغذ صافی مرطوب نگهداری شدند. ظروف پنجه بحدت یک هفته بطور روزانه مورد بازدید قرار گرفته و تعداد تخم‌های تفریخ شده یادداشت و این عمل تا پایان عمر حشرات ماده ادامه یافت.

در پایان این آزمایش اطلاعاتی از قبیل طول دوره جینی، لاروی، شفیرگی و طول دوره زندگی، درصد مرگ و میر لاروی و شفیرگی، درصد ظهور حشرات کامل و میزان تخم‌ریزی روزانه در رقم‌های مختلف تعیین و ثبت گردید.

به منظور بررسی علل ترجیح غذایی و نقش ترکیبات غذایی موجود در بافت آوندی ارقام مختلف در رشد و نمو آفت، اقدام به تجزیه شیمیایی و اندازه گیری ترکیبات غذایی شامل وزن خشک، فیبر خام، قندکل، چربی کل و ۱۲ عنصر غذایی (ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، مینرالیم، سدیم، آهن، منگنز، کلر، روی، مس و سر) گردید. اطلاعات بدست آمده از عوامل رشد و نموی حشره و نیز تجزیه ترکیبات غذایی، توسط روش تعیین همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گام (Stepwise Multiple Regression) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتیجه و بحث

الف- بررسی ترجیح غذایی سرخرطومی حنایی روی رقم های خرما و نخل وحشی رشدونمو سرخرطومی حنایی از تخم تا حشره کامل در رقم های مختلف بطور متوسط ۸۶/۸۳ روز بوده بطوریکه حداقل آن در رقم زردان به میزان ۱۰۲/۵ و حداقل آن در رقم مضائقی ۸۰ روز بود. مرحله لاروی به طولانی ترین زمان برای رشد و نمو نیاز دارد، به عبارت دیگر بطور متوسط ۶۱٪ کل زمان رشد حشره از تخم تا حشره کامل را به خود اختصاص می دهد. طولانی ترین مرحله لاروی در رقم زردان و کمترین آن در گیاه نخل وحشی مشاهده شد، همچنین بیشترین و کمترین طول دوره شفیرگی به ترتیب در رقم های هلیله و پیمازو به ثبت رسید و در گیاه نخل وحشی تمام شفیره ها از بین رفته و هیچ حشره کاملی ظاهر نگردید (جدول ۱ و شکل ۱).


جدول ۱، مدت زمان رشد و نمو مراحل مختلف سرخرطومی حنایی روی ارقام خرما و نخل وحشی

Table 1, Developmental time¹ of RPW on date palm varieties and wild palm.²

Variety	Egg (day)	Larvae (day)	Tخم (روز)	شفیره (روز)	نخل تا حشره	کامل(روز)
Mazafati	1.80±0.07 a	72.00±17.64 ab	15.00±4.24 ab	80.00±2.83 a		
Rabby	1.80±0.03 a	78.55±22.86 ab	17.33±2.08 a	89.00±4.58 a		
Halileh	1.70±0.11 a	61.92±16.57 b	18.33±2.08 a	81.67±3.06 a		
Zardan	1.80±0.14 a	83.33±15.71 a	14.00±0.00 ab	102.5±26.16 a		
Pimazoo	1.90±0.04 a	75.63±15.45 ab	12.00±1.41 b	82.5±16.26 a		
Wild palm	1.87±0.11 a	58.71±14.09 b	-	-	-	-

1- Means±SE

2- Means within a column followed by the same letter not found significant
(P>0.05,DMRT).




شکل ۱، میانگین طول دوره رشد سرخرطومی حنابی از تخم تا شفیره در ارقام خرما و نخل
وحشی

Fig 1, The average developmental of time (egg to pupa) of RPW on date palm varieties and wild palm


بیشترین میزان تلفات لاروی در رقم زردان و گیاه نخل وحشی و کمترین آن در رقم های مضائتی و هلیله مشاهده شد. همچنین حداقل تلفات شفیره در گیاه نخل وحشی به میزان ۳۸/۴۶٪ و حداقل آن در رقم مضائتی به میزان ۲۸/۵۷٪ به ثبت رسید (شکل ۲).

براساس مطالعات انجام شده، بیشترین میزان درصد ظهور حشرات کامل در رقم های مضائتی و هلیله به ترتیب برایر ۲۸/۵۷ و ۲۴/۱۴ درصد و کمترین مقدار آن در گیاه نخل وحشی به مقدار صفر درصد مشاهده گردید (شکل ۳). میزان تخم ریزی روزانه سوسک سرخرطومی حنابی بطور متوسط تعداد ۸/۲ تخم در روز بود که بیشترین تعداد تخم ریزی در رقم مضائتی (۸ تخم در روز) و کمترین آن در رقم زردان (۷/۱۷ تخم در روز) بدست آمد (شکل ۴).




شکل ۲، درصد مرگ و میر لاروی و شفیرگی سرخرطومی حنایی روی ارقام خرما و نخل وحشی

Fig 2, Larval and pupal mortality of RPW on date palm varieties and wild palm



شکل ۳، درصد ظهور حشرات کامل سرخرطومی حنایی روی رسمهای خرما و نخل وحشی

Fig 3, Adult emergence of RPW on date palm varieties and wild palm



شکل ۴، میانگین میزان تخم‌ریزی روزانه سوسک سرخرطومی حنایی روی ارقام خرما

Fig 4, Mean daily oviposition of RPW on date palm varieties

با توجه به نتایج حاصله از آزمایش‌های فوق، گیاه نخل وحشی به عنوان مقاوم‌ترین میزبان و رقم‌های هلیله و مضادتی به عنوان حساس‌ترین رقم‌های خرمابه سوسک سرخرطومی حنایی معرفی می‌شوند. بالا بودن تلفات در گیاه نخل وحشی دلیلی بر وجود مکانیسم آنتی بیوز در آن می‌باشد. مکانیسم آنتی بیوز موجود در نخل وحشی احتمالاً می‌تواند ناشی از عدم تعادل بین ترکیبات غذایی بافت آوندی، عدم وجود یک یا چند ترکیب غذایی مهم و یا بدلیل وجود مواد شیمیایی ثانویه باشد. بنابراین اثرات مزمن آنتی بیوز در گیاه نخل وحشی مانع تبدیل لاروها به شفیره و پیرون آمدن حشرات کامل از پیله‌ها شده و در نتیجه باعث تلفات لاروها در سنین بالا، شفیره‌ها و حشرات کامل می‌شود. همچنین اثرات نامطلوبی از قبیل کاهش وزن جثه، طولانی تر شدن دوره رشد و نمو در آن مشاهده می‌گردد.

ب- تجزیه ترکیبات غذایی رقم‌های خرما و نخل وحشی
براساس نتایج بدست آمده، در بین ترکیبات غذایی بیشترین اختلاف بین ارقام مربوط به مقادیر قندکل، فیبر خام و کلسیم می‌باشد، بطوریکه بالاترین میزان قندهای محلول

در رقمهای مضافتی و هلیله و پایین ترین آن در نخل وحشی و بیشترین مقدار فیبرخام در گیاه نخل وحشی مشاهده شد. علاوه بر آن، حداکثر مقدار کلسیم در نخل وحشی (۳۰.۸%) و حداقل آن در رقم پیمازو (۰.۳۲%) می‌باشد. همچنین بیشترین مقادیر عنصر پتاسیم، منیزیم، کلر، منگنز و بر در گیاه نخل وحشی، حداکثر مقادیر آهن و روی در رقم هلیله، بالاترین مقادیر ازت، فسفر و سدیم در رقم زردان و حداکثر مقدار مس در رقم پیمازو بود (جدول ۲).

جدول ۲، میانگین وزن تعدادی از ترکیبات غذایی و مواد معدنی در ۱۰۰ گرم ماده خشک بافت آوندی رقم های خرما و نخل وحشی (گرم)

Table 2, Mean of weight of some nutrient and minerals elements compounds in 100gr of vascular tissue dry weight of date palm varieties and wild palm (gr)

رقم Vari- ety	وزن خشک Dry weight	وزن		فندک کل	جربی کلسیم	ازت فیبرخام	سدیم	منیزیم	روی	آهن	منگنز
		Total	Crude fibre								
		sugar	lipid								
Mazafati	20.57	37.09	7.38	4.26	1.94	0.48	0.1655	0.25	0.0048	0.0120	0.0011
Rabi	32.10	25.66	4.88	4.71	1.79	0.41	0.1645	0.32	0.0077	0.0011	0.0010
Halileh	19.19	29.69	8.07	3.08	2.15	0.70	0.1756	0.32	0.0077	0.0335	0.0018
Zardan	18.79	25.10	8.68	4.01	2.50	0.45	0.1845	0.33	0.0043	0.0046	0.0010
Pimazzo	19.78	23.71	7.22	4.55	2.20	0.32	0.1285	0.14	0.0046	0.0214	0.0008
Wild palm	13.56	22.35	11.98	3.88	1.93	3.08	0.0986	0.67	0.0058	0.0064	0.0046

ج- بررسی اثر ترکیبات غذایی روی رشد و نمو سرخرطومی حنایی خرما همبستگی های بین عوامل رشد و نمو سرخرطومی حنایی خرما (شامل تلفات لاروی و شفیرگی، ظهر حشرات کامل و تخم ریزی روزانه) و ترکیبات غذایی موجود در بافت آوندی ۵ رقم خرما و گیاه نخل وحشی توسط تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی همبستگی بین هر عامل رشد و نمو آفت و ترکیبات غذایی، عامل رشد و نموی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل به روش

رگرسیون چندگانه گام به گام جهت حذف متغیرهایی که روی عامل رشدونموی فاقد تاثیر معنی دار است، بکار برده شد. کیفیت معادله های رگرسیون برای بیان نتایج بدست آمده به وسیله ضریب تبیین (R^2) ارزیابی شد. نزدیکتر بودن مقدار عددی R^2 به عدد ۱، نشان دهنده کاملتر بودن مدل بدست آمده می باشد.

اختلافات مشاهده شده در بین نتایج بدست آمده از آزمایش های ترجیح غذایی نشان می دهد که کیفیت غذای خورده شده توسط حشره از رقم های مختلف روی عوامل رشدونموی تاثیر می گذارد. تجزیه شیمیایی بافت آوندی نیز اختلافات موجود در ترکیبات شیمیایی این ارقام را به اثبات می رساند. بافت آوندی گیاه نخل وحشی با دارابودن پایین ترین سطوح قندهای محلول و وزن خشک و بالاترین مقادیر فیرخام، کلسیم، پاتسیم، منزیم، کلر، منگنز و بر از سایر ارقام خرماء متمایز می شود. با توجه به ضرایب همبستگی بین ترکیبات غذایی و عوامل رشد و نمودی آفت مشاهده می شود که در پنج مورد همبستگی معنی دار وجود دارد (جدول ۳). بیشترین تعداد همبستگی مربوط به قند کل است که با تلفات لاروی و ظهرور حشرات کامل دارای همبستگی مثبت می باشد. همچنین بالاترین مقدار همبستگی، مربوط به همبستگی بین میزان کلسیم و تلفات شفیره می باشد ($r=0.9178$).

تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون چندگانه نشان داد که اثرات متقابل بین ترکیبات غذایی مختلف روی عوامل رشد و نمودی سرخرطومی حنایی خرماء تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگرچه تلفات شفیرگی با مقادیر کلسیم، سدیم و منگز دارای همبستگی بوده ولی اثرات کلسیم و قندهای محلول ملموس تر می باشد (معادله ۲، جدول ۴). حساسیت کم گیاه نخل وحشی به سرخرطومی حنایی خرماء احتمالاً می تواند ناشی از ترکیبات غذایی موجود در بافت آوندی آن باشد. بالا بودن میزان تلفات آفت در آن ممکن است در نتیجه بالا بودن میزان کلسیم باشد، چراکه بافت آوندی این گیاه دارای بالاترین میزان کلسیم بوده و معادله های رگرسیون نیز نشان می دهد که کلسیم اثر منفی روی رشد سرخرطومی حنایی دارد بطوریکه با افزایش مقدار کلسیم، میزان تلفات افزایش و ظهرور حشرات کامل کاهش پیدا می کند (معادله های ۲ و ۳ جدول ۴). افزایش زیاد یون کلسیم در حشرات منجر به یکسری تغییرات غیر طبیعی در فیزیولوژی و بیوشیمیایی حشره می شود.

جدول ۳، ضرایب همبستگی بین عوامل رشد و نموی سوسک سرخرطومی حنایی و ترکیبات غذایی بافت آوندی درختان خرما و نخل وحشی

Table 3, Linear correlation coefficient between some nutrient compounds of date palms and wild palm vascular tissues and RPW vital qualifications

Nutrient compounds	Vital qualifications	کامل			
		تلفات لاروی	تلفات شفیرگی	ظهور حشرات	تخم ریزی روزانه
Dry weight	وزن حشك	-0.4207	-0.5502	0.5250	0.0512
Total sugar	قندکل	0.8241*	-0.6429	0.8168*	0.8202
Crude fibre	فیبر خام	0.5386	0.7182	-0.6867	-0.2126
Total lipid	چربی کل	0.1806	-0.0405	-0.0670	0.0738
N	ازت	0.4064	-0.2499	-0.0339	-0.6681
ca	کلسیم	0.4298	0.9178**	-0.7684	0.2249
na	سدیم	-0.4663	-0.8965*	0.7848	-0.2481
Mg	منیزیم	0.4138	0.7607	-0.6618	-0.2849
fe	آهن	-0.4472	0.0117	0.1851	0.0901
Zn	روی	-0.6631	-0.3771	0.5335	0.3388
Mn	منگنز	0.3337	0.8581*	-0.6853	0.1330
P	فسفر	0.6478	-0.1023	-0.2471	-0.7139
K	پتاسیم	0.2747	0.7793	-0.6166	-0.2012
Cl	کلر	0.2927	0.7177	-0.5789	-0.1306
cu	مسن	-0.3531	-0.6641	0.5860	0.2337
B	بر	0.3779	0.7179	-0.6109	-0.1453

Explanations: *) Significant at $P<0.05$; **) Significant at $P<0.01$

این تغییرات شامل افزایش بیش از حد تعداد پوست اندازی، کاهش وزن، تاخیر در مراحل رشدی، تغییر رنگ جلد بصورت ظهور لکه های موضعی، نقصان چربی و هیستولیز بافت ها می باشد. همچنین افزایش کلسیم هضم شده توسط حشرات سبب کاهش سطوح کاسترول و چربی خون می شود. کاهش وزن و توزیع چربی های نامشخص در درون بافت لاروهای تیمارشده با یون کلسیم نشان دهنده اختلال در متابولیسم انرژی است (Majumder, 1996). همچنین عامل مهم دیگر در پایین بودن حساسیت نخل وحشی و بالا بودن حساسیت رقم های مضافتی و هلیله، میزان قندهای محلول در آنها می باشد. معادله های رگرسیون نیز نشان می دهد که قندها دارای تاثیر مثبت روی رشد حشره بوده، بطوریکه با افزایش مقدار قند، میزان تلفات در مراحل لاروی و شفیرگی کاهش و ظهور حشرات کامل و نیز تخم ریزی روزانه افزایش می یابد (جدول ۴). قندها از محرك های تغذیه ای عمومی (Phagostimulant) هستند و با توجه به اینکه در ساقه گیاهان بافت های انتقال مواد نسبت به سایر بافت ها غالب بوده و میزان قندها نیز در آنها نسبتاً زیاد است (Bernays and Chapman, 1994)، بنابراین می توان گفت که قندها نقش اساسی در رشد و نمو این آفت دارند و تغییر در میزان آن باعث تغییر در سرعت رشد و نمو حشره می شود.

جدول ۴، نتایج تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون گام به گام برای بررسی اثر ترکیبات غذایی روی عوامل رشد و نمو سرخرطومی حنایی خرماء ($\alpha=0.10$)

Table 4. The equations of standard stepwise multiple regression for nutrient compounds of date palms and wild palm with significant effect at $P=0.1$, on the RPW vital qualificatins. Fitting of regression line expressed by the determination coefficient (R^2)

No.	شماره Qualifications	عوامل رشد و نمود Vital qualifications	معادله Equation	Prob. Level	سطح احتمال Determina- tion coeffi- cient (R^2)	ضریب تبیین (R^2)
1	Larval mortality		$Y = -1.385 \text{ Sugar} - 13.322 \text{ Zn} + 107.246$	0.0348	0.89	
2	Pupal mortality		$Y = 4.210 \text{ Ca} - 1.404 \text{ Sugar} - 25.229 \text{ Na} + 132.110$	0.0095	0.99	
3	Adult emergence		$Y = 1.744 \text{ Sugar} - 2.817 \text{ Ca} + 63.819 \text{ Fe} - 0.448 \text{ Dry weight} - 34.816$	0.0057	1.00	
4	Daily oviposition		$Y = 0.176 \text{ Sugar} - 4.660 \text{ Na} + 0.906 \text{ Mg} + 9.642$	0.0156	1.00	

با توجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می شود که در بین ترکیبات غذایی، مقادیر قندکل، کلسیم، سدیم، روی، منزیم، آهن و وزن خشک بر روی رشد و نمو سرخرطومی حنایی مؤثر می باشند و با مقایسه ضرایب تبیین جزوی این ترکیبات مشخص شد که نقش مقادیر قندکل و کلسیم نسبت به سایر ترکیبات غذایی بیشتر می باشد. همچنین با مقایسه مقادیر کلسیم در رقم های خرما و گیاه نخل و حشی ملاحظه می شود که مقدار کلسیم در نخل و حشی حدود ۲۸ برابر رقم های خرما است و در همین حال این گیاه بعنوان یک میزان نامطلوب برای آفت شناخته شده است. بنابراین در صورتی که میزان یون کلسیم در رژیم غذایی لارو سرخرطومی حنایی افزایش یابد، منجر به مهار رشد و افزایش تلفات می شود.

سپاسگزاری

نگارنده بدینوسیله از آقای مهندس کاظم محمدپور و سایر همکاران عزیز در آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی سراوان به جهت همکاری های فراوان، آقای مهندس آرمان آوند فقیه به خاطر مساعدت های بیدریغ، از مؤسسه تحقیقات خاک و آب و خانم مهندس زرین تاج محقق دوست در بخش بیوتکنولوژی گیاهی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به جهت کمک های ارزشمند در آزمایش های تجزیه شیمیایی تشكیر و قدردانی می نماید. این مقاله بر اساس طرح تحقیقاتی شماره ۱۱۲-۱۱-۷۸-۰۰۵ ساخته شده است.

نشانی نگارنده: مهندس حسین فرازنده، آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

سراوان، صندوق پستی ۳۶۴، سراوان ۹۹۵۱۵

Investigation on the reasons of food preference of red palm weevil, *Rhynchophorus ferrugineus* (Oliv.)

H. FARAZMAND

Plant Pests & Diseases Research Laboratory, Saravan, Sistan and Baluchestan province, Iran

ABSTRACT

Red palm weevil (RPW), *Rhynchophorus ferrugineus* Oliv., is a destructive pest of different palms in Asia, North Africa and South Europe. At present time, it is an internal quarantined pest in Iran which damage on date palm is limited to Saravan region (Sistan & Baluchistan province). Based on accomplished investigation, Mazafati date palms were the most desirable host for RPW.

Several experiments were carried out on the food preference of RPW on 5 date palm varieties includings Mazafati, Rabbi, Halileh, Zardan, Pimazoo and a native wild palm (*Nannorrhops ritchiana* (Griff) Aitch.), during 1999-2001.

Based on the laboratory studies, larval mortality maximum and minimum were in Zardan and Halileh, respectively. The highest pupal mortality was recorded 100%, which found in wild palm. The maximum and minimum of adult emergence were observed for Mazafati and wild palm respectively. The life span of RPW was maximum in Zardan and minimum in Mazafati. The highest and lowest daily oviposition were observed in Mazafati and Zardan respectively.

To determine the reasons of food preference of RPW, vascular tissues of different varieties of date palms and wild palm were analysed and dry weight, crude fibre, total sugar, fat and 12 chemical elements were measured. The stepwise multiple regression analysis shows that, the interaction of various nutrient components affects the vital qualifications of RPW. The most effective nutrients and element were found sugar and calcium. Sugar was correlated with growth and daily oviposition and reduction in mortality, while increasing of calcium clearly inhibited RPW growth.

Key words: *Rhynchoporus ferrugineus*, Food preference, Date palm

References

- AVAND-FAGHIH, A., 1996. The biology of red palm weevil, *Rhynchophorus ferrugineus* Oliv. (Col.: Curculionidae), in Saravan region (Sistan & Balouchistan Province, Iran). *Appl. Ent. Phytopath.*, 63 (1&2): 61-86. (in farsi with English summary)
- BALOCH, H. B., RUSTAMANI, M. A., KHURO, R. O., TALPUR, M. A., HUSSAIN, T., AHMAD, M. and A. R. SHAKOORI, 1994. Incidence and abundance of date palm weevil in different cultivars of date palm. Proceedings of Pakistan Congress of Zoology, Lahore. 12: 445- 447.
- BERNAYS, E. A. and R. F. CHAPMAN, 1994. Host- plant selection by phytophagous insects. Chapman & Hall, Inc. New York, 312 pp.
- FARAZMAND, H., RASSOULIAN, G.H.R., BAYAT-ASADI, H. and K. H. TALEBI-JAHROMI, 2000. Study on host preference of red palm weevil, *Rhynchophorus ferrugineus* Oliv., on date palm important varieties of Balouchistan, Iran. Proceedings of the 14th Iranian Plant Protection Congress. Isfahan. p 115.
- HANOUNIK, S. B., 1998. Steinernematids and heterorhabditids as biological Control agents for red palm weevil (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.). *Journal for Scientific Research, Agricultural Science*, Vol. 3: 95-102.
- MAJUMDER, S. K., 1996. Non-toxic food protectants: comparative nutrition and physiology of pests in relation to the protection of processed foods. *Hunger, Technology and Society*. Internet information, 9 pp.

Address of author: Engg. H. FARAZMAND, Saravan Plant Pests and Diseases Research Laboratory, P.O.Box 364, Saravan-99515, Iran.